



Primitivní reflexy

Dotazník pro rodiče

Milí rodiče, primitivní reflexy se u dětí objevují pouze do určitého věku a jsou nezbytné pro přežití. Někdy se však může stát, že nevymizí a nadále u dítěte přetrvávají, což může ovlivnit správný motorický vývoj dítěte. Vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete doplnit vstupní vyšetření. Zaškrtněte, pokud má dítě s danou aktivitou problém ve více než padesáti procentech času.

TONICKÝ LABYRINTOVÝ REFLEX

☐	snížené svalové napětí
☐	vestibulární dysfunkce (nesnášenlivost změny polohy)
☐	tendence se méně pohybovat, pomalejší tempo
☐	netoleruje polohu na boku, zádech nebo na břiše
☐	dráždivé dítě, potíže se zrakovou fixací a plynulým pohybem očí vůči hlavě
☐	narušené balanční schopnosti
☐	vizuální potíže
☐	problém s orientací v prostoru, problém s odhadem vzdálenosti, hloubky a rychlosti prostoru
☐	častá chůze po špičkách
☐	vadné držení těla (padá na stůl, neschopen vzpřímeného sedu delší dobu, únava)

MORO REFLEX

☐	poruchy soustředění, hyperaktivita (ADHD), hypoaktivita
☐	itlivost na světlo, problémy s černými písmeny na bílém papíře
☐	problém s imunitou, časté záněty ORL
☐	problém s koncentrací (nedokáže odbourat stimuly)
☐	agrese, emoční labilita, nemá rád překvapení
☐	problém s ovládáním pohybů očí
☐	opožděný vývoj řeči
☐	problémy s balancí

ASYMETRICKÝ TONICKÝ ŠÍJOVÝ REFLEX (ATŠR)

	problém koordinace oko–ruka
	problém s psaním (přes střed, na konci řádku velká písmena)
	problém provádět střídavé pohyby
	problém používat obě poloviny těla odděleně
	problém s pohyby přes střed těla
	nesoulad mezi mluveným a psaným projevem
	problém sledovat řádky očima (ovlivňuje čtení, psaní)
	zhoršená reakce na balanční změny

SYMETRICKÝ TONICKÝ ŠÍJOVÝ REFLEX

	porucha koordinace horní a dolní poloviny trupu
	tendence se zhroutit na lavici (na konci školní hodiny leží na stole)
	problém zaostřit oči do dálky a rychle zpět, problém s opisem textu z tabule
	sedí na jedné nebo na obou nohou, „visí“ na židli, leží na stole
	nemůže se soustředit, když musí sedět neustále v jedné poloze
	problém s plaváním (ponoření hlavy)

GALANTŮV REFLEX

	nadměrná citlivost v bederní oblasti zad (vadí opasek, guma od kalhot)
	horší soustředění v sedu a ve škole (vadí opěrka židle)
	pomočování
	skolióza

SACÍ REFLEX

	jazyk zůstává v puse příliš vepředu, leze ven (ztížené žvýkání a polykání, slinění)
	nadměrná citlivost okolo pusy
	potřeba orální stimulace, potřeba pořád něco žvýkat, sát (palec, tužka, vlasy, límec)
	potíže s různou konzistencí jídla
	problém s mluvením, artikulací
	porucha jemné motoriky